




GRANDE ROUSSETTE

Scyliorhinus stellaris
Nursehound 

Présence de filaments



Capsule ne faisant pas partie du programme CapOeRa

Bien que les échouages de capsules de cette espèce soient communs, l'APECS a choisi de cibler ses efforts sur la collecte des capsules d'oeuf de raies.

Ce sont principalement les capsules de petites roussettes qui sont retrouvées sur les plages ou observées en plongée. Il faut veiller à ne pas confondre les deux espèces !




Ne pas confondre ces trois capsules !

- Longueur de la cavité ¹ :

chien espagnol $\approx$ petite roussette < grande roussette

- Absence de filament pour le chien espagnol


- Chez la grande roussette, bordures latérales de la capsule très épaisses et parfois striées






Requin benthique

Longueur max = 190 cm (souvent entre 100 et 120 cm)²



Statut de conservation UICN

(liste rouge Union Internationale pour la Conservation de la Nature)



— France (2013)⁸ — Monde (2021)⁹



Critères de vulnérabilité : manque de connaissances.

Réglementation de la pêche pour les eaux françaises

Aucune réglementation.

Références :

1 - APECS (communications personnelles),
2 - Louisy (2002), 3 - Serena (2005), 4 - Ebert & Stehmann (2013), 5 - Capapé et al. (2006),
6 - Ellis et al. (1996), 7 - Skaramuca & Prtenjača (1985), 8 - UICN France & MNHN (2013),
9 - Finucci et al. (2021)

Habitat

Espèce benthique présente principalement sur fonds avec du relief, rocheux ou recouverts d'algues, mais aussi fonds coralligènes.^{1,2,3,4}

Zone côtière du plateau continentale. En majorité dans les 60 premiers mètres de profondeur, mais présence possible jusqu'à 400 m.^{2,3,4}

Taille à maturité sexuelle

Manque de connaissances sur les tailles à maturité sexuelle de cette espèce.

	♀ (cm)	♂ (cm)
Méditerranée ^{3,5}	79	77

Régime alimentaire

Alimentation basée principalement sur des crustacés, des mollusques (majorité de céphalopodes) ainsi que des poissons, des petits requins et des raies.^{4,6}

Reproduction

Mode : oviparité

Ponte : toute l'année, pic au printemps et à l'été. Autour de 40 oeufs/femelle/an^{3,4,5}

Développement de l'embryon dans la capsule : 9 mois mais recensé jusqu'à 12 mois^{3,4,5}

Taille à l'éclosion : 13 à 16 cm^{3,4,7}

