




PETITE ROUSSETTE

Scyliorhinus canicula
Smallspotted catshark 



Capsule ne faisant pas partie du programme CapOeRa

Bien que les échouages de capsules de cette espèce soient courants, l'APECS a choisi de cibler ses efforts sur la collecte des capsules d'oeufs de raies.

En raison de la présence de filaments aux extrémités de la capsule, il n'est pas rare de trouver, échoués sur la plage, des amas de capsules accrochées entre-elles. Des capsules embryonnées sont aussi régulièrement photographiées par les plongeurs.




Ne pas confondre ces trois capsules !

- Longueur de la cavité ¹ :

chien espagnol $\approx$ petite roussette < grande roussette

- Absence de filament pour le chien espagnol



- Chez la grande roussette, bordures latérales de la capsule très épaisses et parfois striées






Requin benthique

Longueur max = 100 cm (souvent entre 60 et 70 cm, plutôt entre 40 et 50 cm en Méditerranée)^{2,3}



Statut de conservation UICN

(liste rouge Union Internationale pour la Conservation de la Nature)



— France (2013)⁷ — Monde (2021)⁸

Tendance de la population



Critères de vulnérabilité : quantités importantes de captures accessoires.

Réglementation de la pêche pour les eaux françaises

Aucune réglementation.

Références :

- 1 - APECS (communications personnelles),
- 2 - Louisy (2002), 3 - Capapé et al. (2014),
- 4 - Ivory et al. (2004), 5 - Ebert & Stehmann (2013), 6 - Ellis et al. (1996), 7 - UICN France & MNHN (2013), 8 - Finucci et al. (2021)

Habitat

Espèce benthique présente sur tous types de fonds, principalement meubles (sable et vase).^{1,2,5}

De la zone côtière du plateau jusqu'aux pentes continentales. Principalement dans les 100 premiers mètres de profondeur (max 800 m).^{1,2}

Taille à maturité sexuelle

Variations entre les mâles et les femelles et en fonction des secteurs géographiques.^{4,5}

	♀ (cm)	♂ (cm)
Atlantique nord-est ⁵	52-65	49-55
Méditerranée ^{4,5}	40-45	≈40

Régime alimentaire

Alimentation très diversifiée et opportuniste mais basée principalement sur des invertébrés benthiques dont des crustacés, des vers, des coquillages et des céphalopodes.^{5,6}

Juveniles et adultes



Reproduction

Mode : oviparité

Ponte : toute l'année, pic de novembre à juillet. Estimée de 40 à 240 oeufs/femelle/an.^{3,5}

Développement de l'embryon dans la capsule : de 5 à 11 mois, mais en moyenne de 8 à 9 mois⁵

Taille à l'éclosion : 9-10 cm⁵