



RAIE LISSE

Raja brachyura
Blonde ray



10 - 12 cm

Longueur cavité (capsule réhydratée)¹




Cornes supérieures
deux fois plus
longues que les
inférieures, bien
que souvent
cassées

Cavité ventrue et
plus étroite du côté
terminal



Carènes et ailerons
très développés

Carène latérale



Nombre moyen de capsules collectées par plage

Données CapOeRa
2005-2017 APECS



2,7%
de la collecte
nationale

Période des
échouages




Description des échouages

Echouages importants à l'ouest du Cotentin et dans quelques autres zones : baie d'Audierne, côte morbihannaise et nord de la côte vendéenne. Pas ou peu d'échouages en Manche-Est, au sud du Golfe de Gascogne et en Méditerranée.





Raie benthique



Taille à maturité sexuelle (L50)

Variations entre les mâles et les femelles et en fonction des secteurs géographiques.³

	♀ (cm)	♂ (cm)
Répartition globale ^{3,4}	80 - 90	78 - 90
Mer du Nord / Mer Celtique ³	83,4	78
Méditerranée ⁵ (Sardaigne)	87,2	80,8

Reproduction

Mode : oviparité

Ponte : de février à août.
Autour d'une 30^{aine} d'oeufs/
femelle/an^{4,6}

Développement de l'embryon
dans la capsule : ≈ 7 mois^{4,6}

Taille à l'éclosion : 16 à 18 cm⁴

Habitat


Espèce benthique, sur tous types de fonds, meubles ou durs.⁷

Zone côtière du plateau continental et début des pentes. Souvent dans les 150 premiers mètres de profondeur (jusqu'à 400m, rarement 900m).^{4,7}

Régime alimentaire

Différences observées selon les saisons et la taille des individus.

Alimentation plutôt basée sur les crustacés pour les juvéniles et sur les poissons pour les adultes.^{4,8,9}



Réglementation de la pêche pour les eaux françaises

Pêche de loisir autorisée.


Pêche professionnelle réglementée¹⁰ :

- Zones CIEM 4c, 7d-e, 7h, 8a-d : Total admissible de capture (TAC) global raies (conditions détaillées dans le règlement UE 2020)



Statut de conservation UICN

(liste rouge Union Internationale pour la Conservation de la Nature)



France (2013)¹¹ Europe (2015)¹²



Critères de vulnérabilité : taille à maturité sexuelle élevée, manque de connaissances.

Références :

1 - APECS Guide identification capsules (2012), 2 - Stephan et al. (2015), 3 - McCully et al. (2012), 4 - Ebert & Stehmann (2013), 5 - Porcu et al. (2014), 6 - Serena et al. (2010), 7 - Louisy (2002), 8 - Catalano et al. (2007), 9 - Quiniou & Rabarison Andriamirado (1979), 10 - Règlement (UE) 2020/123 du conseil du 27/01/20 établissant pour 2020 les possibilités de pêche de certains stocks halieutiques [...], 11 - UICN France & MNHN (2013), 12 - McCully et al. (2015)